

2. Test de capacité fonctionnelle de la déglutition : à ne réaliser seulement s'il y a bien absence de fausse route à la salive ! La réalisation de ce test est prévue pour être à l'heure du déjeuner afin d'avoir à disposition le temps et les aliments nécessaires.

	T1 Le.../.../...		Conduite à tenir Hydratation/Alimentation	T2 Le.../.../...		Conduite à tenir Hydratation/Alimentation	T3 Le.../.../...		Conduite à tenir Hydratation/Alimentation
	+	-		+	-		+	-	
PROGRESSION des DIFFERENTES DEGLUTITIONS :									
1/ Donner au patient 1 càc d'eau gélifiée (épaississement2) 4 X			SI FR → stop per os			SI FR → stop per os			SI FR → stop per os
2/ Donner au patient 1 càc d'eau gélifiée (épaississement1) 4 X			SI FR → Hydratation EE 2			SI FR → Hydratation EE 2			SI FR → Hydratation EE 2
3/ Test à l'eau 1 càc d'eau 4 X			SI FR → Hydratation EE 1			SI FR → Hydratation EE 1			SI FR → Hydratation EE 1
4/ Alimentation mixée 1 càc 4 X (yaourt)			SI FR → nutrition entérale totale			SI FR → nutrition entérale totale			SI FR → nutrition entérale totale
4'/ Alimentation mixée 1 càc 4 X			SI FR → mixé càc			SI FR → mixé càc			SI FR → mixé càc
5/ Alimentation moulinée 1 càc 4 X (gâteau type roulé)			SI FR → mixée			SI FR → mixée			SI FR → mixée
5'/ Alimentation moulinée 1 càc 4 X (gâteau type roulé)			SI FR → moulinée càc			SI FR → moulinée càc			SI FR → moulinée càc
6/ Alimentation en morceau 1 càc 4 X (fromage à pâte dure)			SI FR → moulinée			SI FR → moulinée			SI FR → moulinée
6'/ Alimentation en morceau 1 càc 4 X (fromage à pâte dure)			SI FR → morceau càc			SI FR → morceau càc			SI FR → morceau càc

EE : Eau épaissie Epaissi. 2 : 500 ml/5 doses d'épaississant. Epaissi. 1 : 500 ml/10 doses d'épaississant.

càc : cuillère à café cs : cuillère à soupe Un verre échancreé peut faciliter la déglutition



Veiller à ce que le patient penche la tête

vers le menton dans la phase réflexe. Si le patient présente une PF : il doit faire une flexion + une rotation du côté sain dans la phase réflexe.